LOCAL DO EXAME: HOSPITAL UNIMED DE VOTUPORANGA – RUA SERGIPE nº 3260 – Tel: 3405 9100

PREPARO PARA RETOSSIGMOIDOSCOPIA

MEDICAÇÕES:

Se fizer uso de ticlopidina (Ticlid®), clopidogrel: suspender medicação 7 dias antes do exame conforme autorização de seu cardiologista.
Se for diabético: não fazer uso de insulina ou hipoglicemiante oral no dia do exame.
Outras medicações de uso crônico devem ser usadas normalmente.
Se fizer uso de anticoagulantes como: varfarina sódica (Marevan® ou Coumadim®), rivaroxaban (Xarelto®), entrar em contato com médico prescritor para
programar suspensão da medicação sob supervisão médica.

DIA DO EXAME:

- Fazer lavagem intestinal com Phosfoenema 2 horas antes do exame.
- Para realização do Phosfoenema, siga as orientações do fabricante: antes de usar, retire a capa protetora de cânula retal. Com Frasco para cima, segue com os dedos a tampa sulcada. Com a outra mão, segure a capa protetora, retirando-a suavemente. Inserir suavemente a cânula no reto, como se a ponta fosse em direção ao umbigo. Comprimir o frasco até ser expelido quase todo líquido. Retire a cânula do reto e tente reter o máximo tolerável o enema, postergando a evacuação.
  Repita este procedimento colocando água no frasco do Phosfoenema até o líquido sair limpo.

- Jejum não é necessário, mas recomenda-se o uso apenas de líquido pela manhã para evitar ocorrência de náuseas.